

Research Paper



The Effect of Interval Training Exercise on the Serum Level of Apelin-17 and Vascular Blood Flow Improvement in Patients with Heart Failure

Hamid Talebifard¹, *Habib Asgharpour², Reza Rezaeeshirazi², Abdulamir Saiiri³

1. PhD student, Department of Physical Education & Sports Sciences, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

2. Assistant Professor of exercise physiology, Department of Physical Education & Sports Sciences, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

3. Assistant Professor of exercise physiology, Department of Physical Education and Sports Science, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.

Use your device to scan
and read the article online



Citation Talebifard H, Asgharpour H, Rezaeeshirazi R, Saiiri A. [The Effect of Interval Training Exercise on the Serum Level of Apelin-17 and Vascular Blood Flow Improvement in Patients with Heart Failure (Persian)]. *Jundishapur Journal of Medical Sciences*. 2023; 22(3):280-289. 10.22118/jsmj.2023.374754.3000

doi <https://doi.org/10.22118/jsmj.2023.374754.3000>

ABSTRACT

Background and Objectives Chronic hypertension causes structural and functional changes in the heart, ultimately leading to heart failure (HF), which further increases mortality. The aim of the present study was to examine the effect of intermittent aerobic exercise on the serum level of Apelin-17 and factors related to blood pressure in patients with HF.

Subjects and Methods In this quasi-experimental study, 20 men with HF were selected based on the inclusion criteria and were randomly divided into exercise and control groups. The exercise program included interval aerobic training exercise that involved three sessions per week continued for eight weeks. Fasting blood samples and physiological variables were measured 48 hours before and after the intervention.

Results After eight weeks of training, there was a significant increase in the levels of Apelin-17 ($P = 0.039$), Ang I ($P = 0.005$) and FMD ($P = 0.008$). A significant decrease in the levels of Ang II ($P < 0.001$) and SBP ($P < 0.001$) was observed, but no significant difference was found in the values of ACE-2 ($P = 0.234$) and DBP ($P = 0.363$).

Conclusion According to the results, it can be stated that one of the adaptations of exercise that improves blood flow and lowers blood pressure in patients with HF is increasing the level of Apelin-17 in these patients.

Keywords Heart failure, Exercise training, Flow-mediated vasodilation, Angiotensin, Apelin-17

Received: 29 Nov 2022

Accepted: 11 Sep 2023

Available Online: 21 Sep 2023

* Corresponding Author:

Habib Asgharpour

Address: Department of Physical Education & Sports Sciences, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

Tel: +989113922124

E-Mail: habibasgharpour@gmail.com

Extended Abstract

Introduction

Heart failure (HF) is a complex clinical syndrome caused by various structural or functional abnormalities of the heart that impair the filling capacity of the ventricles (2). Despite several treatments adopted according to the pathology of the disease and the patient's condition, the mortality rate after the diagnosis of HF is still high (7). Therefore, HF places a significant clinical and economic burden on patients and healthcare systems (3). This highlights the need to adopt preventive and therapeutic programs in order to reduce the complications caused by this disease (9). It has been reported that the serum concentration of Apelin-17 isoform varies according to the blood pressure category in subjects with Class 3 obesity. Patients with high blood pressure have been reported to show lower concentrations of all isoforms (13). Plasma Apelin-17 levels in ischemic stroke patients positively correlate with increased peripheral blood flow. Animal study data have shown that this increase is likely due to cerebral arteriolar dilatation caused by the vasodilating effects of Apelin-17, which is mediated through the NO-cGMP pathway (12). This research shows the importance of controlling Apelin-17 as a peptide related to cardiovascular complications in patients with HF. Exercise training programs are one of the main elements in cardiac rehabilitation of patients with HF (14). Moderate intensity continuous exercises are an effective treatment for left ventricular reconstruction and performance improvement in these patients (15). However, few, if any, studies have been specifically conducted to determine the effect of exercise on variables related to blood pressure, especially apelin-17 as a peptide related to cardiovascular complications. Therefore, the aim of this study was to examine the effect of intermittent aerobic exercise with moderate intensity on Apelin-17 and some factors related to peripheral vascular resistance in patients with heart failure.

Methods

In this quasi-experimental research, 20 men were selected from among patients with heart failure referring to the Cardiac Rehabilitation Center of Imam Khomeini Hospital in Ahvaz according to the research inclusion criteria. After the patients were selected, they were briefed on the conditions of the research protocol in a meeting, and their informed consent was obtained prior to commencement of the research interventions. Research variables were measured 48 hours before the intervention and 48 hours after the last training session. To measure height and weight, a SECA scale and a scale made in Germany were used. The subjects' blood pressure was measured after 5 minutes of rest in a sitting position using a Mamiso Set S1800 digital arm sphygmomanometer. The fasting blood samples of the patients were taken after blood pressure test. Fasting brachial Flow-Mediated Dilation (FMD) was measured subjects' left arm in supine position using an ultrasound machine (UNEX 18G, Japan) and according to a standard protocol (17). Then,

the exercise group received intervention, while no exercise intervention was offered in the control group. The exercise training program included interval aerobic exercise that involved three sessions per week continued for eight weeks under the supervision of the researcher. In each session, the patient did the progressive aerobic exercise for two 10-minute periods using a treadmill and a stationary bike. Each phase consisted of 5 stages (three stages of increasing intensity similar to an ascending pyramid totaling 6 minutes and two stages of decreasing intensity totaling 4 minutes). This protocol was performed with a load of 40 to 85% of the heart rate reserve of the subjects. The target heart rate in the present study was calculated using Karonen's formula (19). Paired sample t-tests and analysis of covariance were used for statistical analysis.

Results

In examining intra-group changes, the results of the dependent t-test showed that after the exercise intervention period, there was a significant increase in the levels of Ang I ($P = 0.006$) and FMD ($P < 0.001$). A significant decrease in the levels of Ang II ($P < 0.001$), Apelin-17 ($P = 0.001$) and systolic blood pressure (SBP) ($P < 0.001$) was observed, but no significant difference was found in terms of the values of ACE-2 ($P = 0.062$) and diastolic blood pressure (DBP) ($P = 0.251$). In the control group, there was no significant change in any of the examined variables ($P > 0.05$). Results of covariance analysis showed that changes in Ang I ($P = 0.013$), Ang II ($P < 0.001$), Apelin-17 ($P = 0.001$), FMD ($P = 0.008$) and SBP ($P < 0.001$) were significant in the exercise group compared to the control group, but no significant difference was observed between the two groups in terms of the changes of ACE-2 and DBP ($P > 0.05$).

Conclusion

The results of this research showed that after the exercise intervention period, a significant decrease in the levels of Ang II, Apelin-17 and SBP and a significant increase in the levels of Ang I and FMD were observed in the exercise group compared to the control group. Our results regarding the effect of interval training on Ang II plasma values indicate that participation in aerobic interval training exercise led to a significant decrease in Ang II plasma values. In fact, one of the positive effects of exercise is modulation of Ang II signaling following exercise in patients with HF. Cellular mechanisms in adaptation to aerobic exercise may possibly affect the sympatho-excitatory process by reducing oxidative stress and increasing nitric oxide (20). The renin-angiotensin system can be considered as a dual functional device that can change its mode as a vasodilator/multicellular skill, or a vasoconstrictor/cell proliferation with the balance of ACE2/ACE ratio (23). Therefore, an increase in the ACE2/ACE ratio leads to a decrease in Ang II production and an increase in Ang I levels and vasodilation, while a decrease in the ACE2/ACE ratio causes an increase in Ang II and a decrease in Ang I levels

and vasoconstriction (23). Our results further indicated the improvement of FMD after the exercise intervention period, and this functional dilatation of the blood flow can be related to the reduced peripheral resistance of the vessels in adaptation to exercise training (24). The improvement of FMD in the present study can be justified as a vascular adaptation to training sessions. Vascular endothelial function is essential for maintaining vessel wall health and vasomotor control. These functions are due to the production of numerous atacoids, especially nitric oxide (NO) (25). According to the results of the present research, it can be argued that one of the effective factors in reducing systolic blood pressure in patients with HF is vascular adaptations following exercise which leads to improved endothelial function. Overall, the findings of this research showed that eight weeks of intermittent aerobic exercise increased the level of Apelin-17 and regulated the enzymes affecting blood vessels, which reduced the peripheral pressure of blood vessels, and thus facilitated blood flow in patients with HF. This suggests that moderate-intensity aerobic interval exercise can be beneficial for patients with HF.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

All steps of the present research have been approved by the Ethics Committee of the Physical Education Institute (IR.SSRI.REC.1400.1231).

Funding

This article has no financial sponsor.

Authors contributions

Conceptualization, methodology, data analysis, initial draft preparation, editing and review, project management: Hamid Talebi Fard, Habib Asgharpour;

Data collection, review, conceptualization: Hamid Talebi Fard, Habib Asgharpour, Abdulamir Sajjari.

Conflicts of interest

According to the authors, this article has no conflict of interest.

Acknowledgements

This article is a part of the Ph D thesis of the first author registered in the Islamic Azad University, Aliabad Katoul branch. The authors are grateful to all those who have cooperated in this research.

مقاله پژوهشی

اثر تمرینات تناوبی بر سطح سرمی آپلین ۱۷ و بهبود جریان خون عروقی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

حمید طالبی فرد^{۱*}، حبیب اصغرپور^۲، رضا رضائی شیرازی^۲، عبدالامیر سیاری^۳

۱. دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی آباد کنول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کنول، ایران.
۲. استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی آباد کنول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کنول، ایران.
۳. استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

Use your device to scan
and read the article online



Citation Talebifard H, Asgharpour H, Rezaeeshirazi R, Saiiri A. [The Effect of Interval Training Exercise on the Serum Level of Apelin-17 and Vascular Blood Flow Improvement in Patients with Heart Failure (Persian)]. *Jundishapur Journal of Medical Sciences*. 2023; 22(3):280-289. 10.22118/jsmj.2023.374754.3000

doi <https://doi.org/10.22118/jsmj.2023.374754.3000>

چکیده



زمینه و هدف پژوهشی خون مزن باعث تغییرات ساختاری و عملکردی در قلب می شود که در نهایت منجر به نارسایی قلبی (HF) می شود که باعث افزایش بیشتر مرگ و میر می شود. هدف تحقیق حاضر تعیین اثر یک دوره تمرینات تناوبی هوازی بر سطح سرمی آپلین ۱۷ و عوامل مرتبط با فشار خون در بیماران مبتلا به HF بود.

روش بررسی در تحقیق نیمه تجربی حاضر ۲۰ مرد مبتلا به HF بر اساس شرایط ورود به تحقیق انتخاب شدند و به صورت تصادفی به ۲ گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل تمرینات هوازی تناوبی بود که به مدت هشت هفته تمرین، سه جلسه در هفته اجرا شد. ۴۸ ساعت قبل و پس از مداخله متغیرهای خونی و فیزیولوژیک به صورت ناشتا اندازه گیری شدند.

یافته ها پس از هشت هفته تمرین تمرین افزایش معنی داری در سطوح آپلین ۱۷ (P = +/+0.39)، Ang I (P = +/+0.05) و FMD (P = +/+0.08) و کاهش معنی داری در سطوح II (P < +/+0.01) و SBP (P < +/+0.01) مشاهده شد ولی تفاوت معنی داری در مقادیر ACE-2 (P = +/+0.234) و DBP (P = +/+0.263) مشاهده نشد.

نتیجه گیری با توجه به نتایج می توان گفت که یکی از سازگاریهای تمرینی که موجب بهبود جریان خون و کاهش فشار خون در بیماران مبتلا HF افزایش سطح آپلین ۱۷ در این بیماران می باشد.

کلیدواژه ها نارسایی قلبی، تمرین ورزشی، اتساع عروقی وابسته به جریان، آنزیوتانسین، آپلین-۱۷

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱ آذر ۰۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲ شهریور ۲۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲ شهریور ۳۰

نویسنده مسئول:

حبیب اصغرپور

نشانی: گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی آباد کنول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کنول، ایران.

تلفن: ۰۹۱۱۳۹۲۲۱۲۴

ایمیل: habibasgharpour@gmail.com

جندی شاپور

مقدمه

۱۷ بر اساس دسته بندی فشار خون در افراد دارای چاقی کلاس ۳ متفاوت است گروهی از بیمارانی که فشار خون بالا را نشان دادند غلظت کمتری از همه ایزوفرمها را نشان دادند [۱۲]. سطح آپلین-۱۷ پلاسمما در بیماران سکته مغزی ایسکمیک به طور مثبت با افزایش گردش خون جانی ارتباط دارد، و داده های مطالعه حیوانی نشان داده است، که احتمالاً این افزایش ناشی از اتساع شریان مغزی ناشی به واسطه اثرات رگ گشاپی آپلین-۱۷ باشد که از طریق مسیر NO-cGMP واسطه شده است [۱۲]. این تحقیقات نشان دهنده اهمیت کنترل آپلین-۱۷ به عنوان یک پیتید مرتبه با عوارض قلبی عروقی در بیماران مبتلا به HF می باشد.

برنامه های تمرینی ورزشی یکی از ارکان اساسی در توانبخشی قلب در بیماران مبتلا به HF است [۱۴]. در همین خصوص تاکر و همکاران در متانالیزی که روی تحقیقات ثبت شده از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ انجام دادند گزارش کردند که در بیماران مبتلا به HF که از نظر بالینی دارای کاهش کسر تزریقی پایدار بودند، تمرینات تداومی با شدت متوسط یک درمان موثر برای بازسازی بطن چپ و بهبود عملکرد در این بیماران می باشد [۱۵]؛ با این وجود تحقیقی که به طور خاص به تعیین تمرینات ورزشی بر متغیرهای مرتبه با فشار خون بخصوص آپلین-۱۷ به عنوان یک پیتید مرتبه با عوارض قلبی عروقی انجام نشده است؛ که ضرورت تحقیق حاضر را نشان می دهد.

با توجه به مطالب گفته شده هدف تحقیق حاضر مقایسه اثر تمرینات هوایی تناوبی با شدت متوسط بر آپلین-۱۷ و برخی عوامل مرتبه با مقاومت عروق محیطی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بود.

روش بررسی

در تحقیق نیمه تجربی حاضر ۲۰ مرد از بیماران مبتلا به ناتوانی قلبی مراجعه کننده به مرکز بازنوی قلب بیمارستان امام خمینی اهواز با توجه به معیارهای پژوهشی انتخاب شدند. شرایط ورود به تحقیق شامل نارسایی قلبی، قرار گیری در طبقه ۱ بیماری بر اساس طبقه بندی انجمن قلب نیویورک [۱۶]، دامنه سنی ۳۵ تا ۶۰ سال، پرفشارخونی سیستولی سطح ۱ یا همان درجه متوسط فشارخون سیستولی ۱۴۵ تا ۱۳۵ میلی متر جبوه، هایپرتروفی مرضی قلبی از نوع کانستربک خفیف تا متوسط (نسبت توده بطنی به سطح روحیه بدنی (LVMI) ۱۱۶ تا ۱۴۸ gr/m²) و نسبت ضخامت دیواره به ابعاد پایان دیاستولی (RWT<۰.۴۲)، قرار گیری در طبقه سطح پایین خطر، مصرف داروی تقریباً مشابه (وزارتان، تریامترن اچ، متورال یا کارودیلول، سالوتامول) و ابتلا به اختلال تنفسی بود. شرایط خروج از تحقیق نیز شامل داشتن سایه نارسایی کلیوی، انفارکتوس قلبی و یا جراحی باز قلبی، ابتلا به تنگی آئورت(Aortic Stenosis)، کاردیومایوپاتی متنفس شده (Dilated Cardiomyopathy)، بروز مکرر PVC در تمرین و یا بروز و ظهور AF، بروز تنگی نفس مکرر در جلسات تمرینی، ترک

پرفشاری خون مزمن باعث تغییرات ساختاری و عملکردی در قلب می شود که در نهایت منجر به نارسایی قلبی (HF) می شود که باعث افزایش بیشتر مرگ و میر می شود [۱]. HF یک سندروم بالینی پیچیده است که به دلیل ناهنجاری های مختلف ساختاری یا عملکردی قلب ایجاد می شود و ظرفیت پر کردن بطن را مختلف می کند [۲]. HF از بیماری های شایع کشورهای غربی می باشد و شیوع آن به طور مداوم افزایش می یابد و آمار جهانی نشان داده که بیش از ۳۳ میلیون بیمار در سراسر جهان به ویژه در میان جمعیت پیر به این بیماری مبتلا هستند [۳]. خطر ابتلا به HF در بزرگسالان آمریکای شمالی در سن ۴۵ سالگی ۲۰ درصد است [۴] و انتظار می رود امار مبتلایان به این سندروم طی ۱ تا ۲ دهه آینده دو برابر شود [۵]. در ایران بیش از یک میلیون نفر به HF مبتلا هستند. شیوع این بیماری در ایران ۸ درصد گزارش شده است که بیشترین میزان آن در استان های خوزستان و گیلان است [۶] با وجود درمان های متعددی که با توجه به پاتولوژی بیماری و شرایط بیمار اتخاذ می شد، میزان مرگ و میر پس از تشخیص HF همچنان بالا است [۷]. بنابراین، HF بار بالینی و اقتصادی قابل توجهی بر دوش بیماران و سیستم های مراقبت های بهداشتی می گذارد [۳]؛ که نشان دهنده لزوم اتخاذ برنامه های پیشگیری کننده و درمانی برای کاهش عوارض ناشی از این بیماری می باشد.

تنها با افزایش در درک مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک مرتبه با ایجاد آسیب و اختلال عملکرد قلبی می تواند به رویکردهای نوآورانه تر و تخصصی شده تر برای مدیریت HF اجازه دهد تا به برنامه های درمانی مناسب رسید. سیستم رین آنژیوتانسین (RAS) با تنظیم فشار خون و تعادل الکتروولیت ها، نقش مهمی در فیزیولوژی قلب و عروق دارد. RAS عمده توسط هر دو آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) و آنزیم تبدیل آنژیوتانسین (ACE2) تنظیم می شود. با این حال، تعادل بین پیتیدها و پیتیدهای مختلف که مسیر RAS/ACE را تشکیل می دهند تا حد زیادی در بیماران مبتلا به HF آشکار نشده است [۸]. سیستم آپلینزیک (apelinergic system) به عنوان یک هدف درمانی جدید برای سلامت قلب و عروق، هموستانز مایعات، محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آرنال (HPA) و همچنین متابولیسم کربوهیدرات و چربی در نظر گرفته می شود. دو لیگاند پیتیدی درون زا، یعنی آپلین(apelin) و الابلا(elabelin)، نشان داده شده است که عملکردهای متابولیکی و عصبی مختلف آن را تعديل می کنند [۹]. در سال ۱۹۹۸ تاتمپیو و همکاران آپلین را به عنوان لیگاند گیرنده API، یک گیرنده جفت شده با پروتئین G شناسایی کردند [۱۰]. آپلین یک پیتید درون را است که یک لیگاند برای گیرنده آنژیوتانسین ۱ (APJ) است [۱۱]. آپلین، یک واسطه ضروری هموستانز است و نقش مهمی در بیماری های قلبی عروقی دارد [۱۲]. گزارش شده است که غلظت سرمی ایزوفرم آپلین

این برنامه ابتدا براساس عملکرد بیمار در تست ورزش (مقدار MET مصرفی)، تغییرات ضربان قلب در حالت استراحت و با توجه به اطلاعات به دست آمده از ECG (تله متري پرتبل)، سطح ريسک اختلال قلبي براساس دستور العمل ACSM تعیین شد. در هر جلسه بیمار به مدت دو و هله ۱۰ دقیقه‌اي با استفاده از تردیمیل و دوچرخه ثابت به صورت هوایی فراینده تمرين کردند. هر وله شامل ۵ مرحله (افزایش شدت به صورت هرمی صعودی در سه مرحله اول کلًا ۶ دقیقه و دو مرحله نزول شدت کلًا ۴ دقیقه) بود. اين پروتوكل با بار ۴۰ تا ۸۵ درصد ضربان قلب ذخیره آزمودنی ها انجام شد. ضربان قلب هدف در تحقیق حاضر با استفاده از فرمول کارون محاسبه شد [۱۹].

$$\begin{aligned}
 & (\text{ضربان قلب استراحتی} - \text{ضربان قلب حداکثر در تست ورزش}) = \\
 & \text{ضربان قلب ذخیره} \\
 & \text{ضربان قلب استراحتی} + \text{درصد شدت مورد نظر در جلسه تمرينی} \times \\
 & \text{ضربان قلب ذخیره} = \text{ضربان قلب تمرين}
 \end{aligned}$$

برای تجزيه و تحليل داده های گردآوري شده در مرحله پيش آزمون و پس آزمون از روش های آماري توصيفي و تحليلي به شيوه هاي زير استفاده مي شود. آمار توصيفي شامل فراوانی، ميانگين و انحراف استاندارد و آمار استنباطي به صورت آزمون شاپير و يك جهت بررسی طبیعی بودن داده ها، آزمون لوین برای برسی همگنی واريانس ها، آزمون تحليل کوواريانس استفاده شد. کليه تحليل های آماري با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ و در سطح معنی داري ($P < 0.05$) انجام شد.

جلسات تمرين پيش از ۱ هفته و يا پيش از ۳ جلسه متوالي بود. پروتوكل تحقیق حاضر توسط کميته اخلاق در پژوهشگاه تربیت بدنی به شماره (IR.SSRI.REC.1400.1231) ثبت شده است.

پس از انتخاب نمونه ها در جلسه اي شرایط طرح تحقیق برای همه توضیح داده شد و پس از اضافي رضایت نامه آگاهانه، مداخلات تحقیق براساس گروه هاي تحقیق اعمال شد. ۴۸ ساعت قبل و ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرين متغيرهای تحقیق اندازه گیری شد. برای اندازه گیری قد و وزن از قدستج و ترازوی مدل SECA ساخت کشور آلمان استفاده شد. فشار خون آزمودنی ها پس از ۵ دقیقه استراحت به صورت نشسته و با استفاده از دستگاه فشار سنج بازویی دیجیتال مدل Mamiso Set S1800 سنجیده شد. نمونه های خون بیماران نيز به صورت ناشتا و پس از تست فشار خون گرفته شد. برای سنجش پروتئين های آپيلين - I، Ang II و Ang II از تکنيک الایزا و کيت های شركت Hangzhou Eastbiopharm استفاده شده است. انساع عروقی وابسته به جريان (FMD) بازویی در حالت ناشتا و به صورت خوابیده طاق باز و با استفاده از دستگاه سونوگرافی (UNEX 18G) ساخت کشور ژاپن، از بازوی چپ آزمودنی ها بر اساس پروتوكل استاندارد اندازه گيری شد [۲۰].

برنامه تمرين ورزشي در تحقیق حاضر شامل هشت هفته تمرين و سه جلسه تمرين در هفته تحت نظارت پژوهشگر بود که با حضور پرستار اجرا گردید. با توجه به سير کادين ريم به عنوان يكی از ريسک فاكتورهای قلبی [۲۱] تمامی جلسات تمرين در عصر برگزار شد. در قسمت هوایی

جدول ۱. ویژگی های بخش تناوبی هوایی

ردیف	حرکت	زمان هر مرحله (دقیقه)	وسیله تمرينی - شدت
۱	حرکات کششی	۵	تردمیل یا دوچرخه با سرعت کمتر
۲	گرم کردن	۳	۸۵-۴۰ % ضربان HRR با تردیمیل
۳	شروع تمرين	ده تناوب هر تناوب یک دقیقه	بسته به زمان رسیدن بیمار به سطح ضربان قلب استراحتی
۴	استراحت بین استفاده از دوچرخه و تردیمیل	۳-۵	۸۵-۴۰ % ضربان HRR با دوچرخه ثابت
۵	ادامه تمرين	ده تناوب هر تناوب یک دقیقه	تردمیل یا دوچرخه با سرعت کمتر از شدت اولیه تمرين هر جلسه - به همراه حرکات کششی
۶	سرد کردن	۳	

جدول ۲. طریقه اعمال اضافه بار در بخش تناوبی هوایی

هفتنه	مرحله	HRR شدت بار تناوب ها
۱	آشنازی	۴۰-۵۰
۲	اضافه بار	۵۵-۵۰
۳	اضافه بار	۶۰-۵۰
۴	اضافه بار	۶۵-۵۰
۵	اضافه بار	۷۰-۵۰
۶	اضافه بار	۷۵-۵۰
۷	اضافه بار	۸۰-۵۰
۸	اضافه بار	۸۵-۵۰

جندی شاپور

یافته ها

Ang FMD ($P = 0.006$) و کاهش معنی داری در سطوح Ang II ($P < 0.001$)، Apelin-17 ($P = 0.001$) و SBP ($P < 0.001$) مشاهده شد ولی تفاوت معنی داری در مقادیر ACE-2 ($P = 0.062$) و DBP ($P = 0.251$) مشاهده نشد. در گروه کنترل تغییر معنی داری در هیچگدام از متغیرهای مورد بررسی مشاهده نشد ($P > 0.05$). در مقایسه بین گروهی نیز نتایج آزمون تحلیل کوواریانس (جدول ۴) نشان داد که تغییرات FMD ($P = 0.001$)، Ang II ($P = 0.013$)، Ang I ($P < 0.001$)، Apelin-17 ($P < 0.001$) و SBP ($P = 0.008$) در گروه تمرين نسبت به گروه کنترل معنی دار بود ولی تفاوت معنی داری بین تغییرات ACE-2 و DBP و بین دو گروه تمرين و کنترل مشاهده نشد ($P > 0.05$).

در بررسی نرمال بودن و همچنین تجانس واریانس متغیرهای مورد بررسی نتایج آزمون های شاپیروویلک و لوین نشان داد که متغیرهای مورد بررسی دارای پیش شرط توزیع نرمال و همچنین تجانس واریانس ها می باشند.

جدول ۳ مربوط به متغیرهای قد، وزن، سن و شاخص توده بدن آزمودنی ها در گروه های تمرين تناوبی هوایی و کنترل می باشد. در بررسی تغییرات درون گروهی نتایج آزمون تی وابسته (جدول ۴) نشان داد که پس از دوره مداخله تمرين افزایش معنی داری در سطوح Ang I

جدول ۳. مشخصات دموگرافی گروه های مختلف تحقیق

متغیر	گروه	کنترل	تناوبی هوایی
قد(cm)		۱۷۰/۳±۷/۶	۱۶۸/۳±۸/۱
وزن(kg)		۸۷/۶±۷/۹	۸۲/۵±۷/۸
سن(year)		۴۸/۸±۸	۵۲/۹±۶/۹
شاخص توده بدن (Kg/m ²)		۲۹/۲±۱/۱	۲۷/۳±۹

جدول ۴. مقادیر پیش و پس آزمون متغیرهای تحقیق در گروه های تمرين و کنترل

متغیر	گروه	پیش آزمون	پس آزمون	درون گروهی	بین گروهی
آنژیوتانسین ۱ (ng/dl)	کنترل	۶۷۹/۸۴±۴۹/۵	۶۷۳/۸۳±۵۳/۲	۰/۲۱۸	۰/۰۰۶*
آنژیوتانسین ۲ (ng/dl)	تناوبی هوایی	۶۷۷/۸۳±۶۴/۱	۸۱۱/۹۳±۶۱/۲	۰/۰۰۶*	۰/۰۱۳#
آنژیوتانسین ۳ (ng/dl)	کنترل	۱۷۷/۱۷±۳۰/۷	۱۷۸/۱۸±۳۲/۱	۰/۰۱۹	۰/۰۰۱*
آنژیوتانسین ۴ (ng/dl)	تناوبی هوایی	۱۷۶/۱۱±۴۲/۱	۱۴۰/۱۲±۴۵/۳	۰/۰۰۱*	۰/۰۰۱#
آنژیوتانسین ۵ (ng/dl)	کنترل	۵۳/۱۴±۸/۶	۵۶/۱۴±۸/۲	۰/۱۲۷	۰/۰۰۱*
آنژیوتانسین ۶ (ng/dl)	تناوبی هوایی	۵۴/۱۵±۵/۹	۶۳/۱۶±۸/۲	۰/۰۶۲	۰/۰۰۱*
آپلین ۱ (ng/dl)	کنترل	۷۹/۳۸±۹/۴	۷۷/۳۹±۸/۲	۰/۶۴۸	۰/۰۰۱*
آپلین ۲ (ng/dl)	تناوبی هوایی	۷۳/۳۳±۷/۵	۹۳/۲۶±۸/۸	۰/۰۰۱*	۰/۰۰۱#
اتساع وابسته به جریان (%)	کنترل	۱±۳۲/۴/۸۳	۱±۰۸/۴/۵۹	۰/۳۱۷	۰/۰۰۱*
اتساع وابسته به جریان (%)	تناوبی هوایی	۱±۱۲/۴/۵۶	۱±۲۳/۵/۴۷	۰/۰۰۱*	۰/۰۰۰۸#
فشار خون سیستول (mmHg)	کنترل	۱۴۱/۴±۱۲/۳	۱۴۰/۵±۱۱/۵	۰/۴۲۹	۰/۰۰۱*
فشار خون دیاستول (mmHg)	کنترل	۱۳۹/۲±۱۳/۷	۱۳۰/۲±۱۳/۳	۰/۰۰۱*	۰/۰۰۱#
فشار خون دیاستول (mmHg)	تناوبی هوایی	۸۱/۵±۵/۲	۸۱/۵±۵/۴	۰/۷۳۱	۰/۰۰۱*
فشار خون دیاستول (mmHg)	تناوبی هوایی	۸۲/۴±۵/۹	۸۱/۴±۳/۴۲	۰/۰۲۵۱	۰/۰۲۵۱

*تفاوت معنی دار نسبت به پیش آزمون؛ #تفاوت معنی دار نسبت به گروه کنترل

بحث

شد. نتایج تحقیق در مورد تاثیر تمرينات تناوبی بر مقادیر پلاسمایی Ang II، بیانگر آن است که مشارکت در تمرينات تناوبی هوایی باعث کاهش معنادار مقادیر پلاسمایی Ang II شد.

در واقع یکی از اثرات مثبت تمرينات ورزشی تعديل سیگنانالینگ II

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پس از دوره مداخله تمرين کاهش معنی داری در سطوح Ang II، Ang I و Apelin-17 و SBP و افزایش معنی داری در سطوح FMD و Ang I در گروه تمرين نسبت به گروه کنترل مشاهده

تجوییه کرد. عملکرد اندوتیال عروقی برای حفظ سلامت دیواره عروق و کترول واژوموتور ضروری است. این عملکردها به دلیل تولید اناتکوئیدهای متعدد، بخصوص اکسید نیتریک (NO) می‌باشد [۲۵]. با توجه به نتایج تحقیق حاضر می‌توان گفت که یکی از عوامل موثر بر کاهش فشار خون سیستول در بیماران مبتلا به HF سازگاری‌های عروقی متعاقب تمرینات ورزشی و درنتیجه بهبود عملکرد اندوتیال می‌باشد.

نتایج تحقیق ما نشان داد که انجام هشت هفته تمرینات تناوبی هوایی در بیماران HF باعث افزایش معناداری در مقادیر پاسماهی آپلین-۱۷ شد. در بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده تحقیقی که به طور خاص به بررسی اثر روش‌های تمرینی مختلف بر آپلین-۱۷ انجام شده باشد یافت نشد. با این وجود در تحقیقات مختلف که به بررسی اثر روش‌های مختلف تمرین بر آپلین کل یا ایزوفرم‌های مختلف انجام شده است که نشان دهنده اثرات مثبت تمرین بر افزایش آپلینی می‌باشند. با وجود اینکه سیستم اپلینزیک در بیماری HF دچار مشکل می‌شود و تخریب سریع پیتیدهای آپلین درون زا در داخل بدن، استفاده از آنها را به عنوان عوامل درمانی محدود می‌کند [۲۶]؛ اما می‌توان تمرینات را به عنوان یک روش درمانی غیردارویی برای افزایش آپلین استفاده کرد که می‌تواند منافعی برای بیماران مبتلا به HF مانند کترول فشار خون داشته باشد. نتایج تحقیق ما با نتایج تحقیقات فوجی و همکاران [۲۷] و سون و همکاران [۲۸] نیز که اثر تمرین حاد و مزمز بر سطح آپلین را بررسی کرده بودند، همخوانی داشت؛ البته در تحقیق ما به طور خاص به تعییرات ایزوفرم آپلین ۱۷ پرداخته شد. آپلین، یک هورمون پیتیدی درون زا با قطعات فعل مختلف، عملکردهای بیولوژیکی متعددی را با فعال کردن گیرنده جفت شده با پروتئین G، گیرنده آپلین (ApelinR، ژن: APLNR)، که قبلاً API نامیده می‌شد، اعمال می‌کند. پیتیدهای آپلین که به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته اند شامل ۱۳، ۱۷ و ۳۶ اسید آمینه باقی مانده در ناحیه C ترمینال آپلین، یعنی آپلین-۱۳، آپلین-۱۷، و آپلین-۳۶، و همچنین [pyr-1]-apelin-13 است. در حالی که همه این پیتیدها می‌توانند انتقال سیگنال با واسطه ApelinR را القا کنند، قطعات کوتاتر اثربخشی بالاتری را نشان می‌دهند، با آپلین-۱۳ که ۶۰ برابر بیشتر از آپلین-۳۶ پاسخ می‌دهد [۲۹]. گزارش شده است که آپلین-۱۷ ممکن است رگ‌های خونی مغز را شل کند تا جریان خون را افزایش دهد [۱۲]، بنابراین به علت احتمال بروز سکته مغزی در بیماران HF به نظر می‌رسد که افزایش آپلین-۱۷ با گردش سلول‌های اندوتیال تنظیم می‌کند و باعث تولید NO می‌شود [۲۷]. احتمالاً افزایش سطح آپلین پلاسمای ناشی از سازگاری به تمرینات ورزشی موجب کاهش سفتی شریانی در افراد مبتلا به HF می‌شود که نتیجه آن به صورت بهبود FMD و در نتیجه کاهش فشار خون در تحقیق حاضر

به دنبال تمرين ورزشی در بیماران مبتلا به HF است. مکانیسم‌های سلولی احتمالی در سازگاری به تمرینات هوایی ایجاد می‌شود ممکن است با کاهش استرس اکسیدانتیو، افزایش اکسید نیتریک، فرآیند سمپاتو-تحریکی را تحت تاثیر قرار دهد [۲۰]. کم تحریکی عواملی را که به نحوی در افزایش غلظت آنژیوتانسین و حساسیت به آن موثر هستند را تحریک می‌نماید. این احتمال وجود دارد که کم تحریکی احتمالاً از طریق افزایش سطح گیرنده‌های AT1 و AT2 و نیز بیشتر شدن بین ژنی و گیرنده سیستم RAS رین آنژیوتانسین (RAS)، منجر به افزایش سطح Ang II شود [۲۰]. با تنظیم فشار خون و تعادل الکتروولیت‌ها، نقش مهمی در فیزیولوژی قلب و عروق دارد. RAS عمدهاً توسط هر دو آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) و آنزیم تبدیل آنژیوتانسین نوع ۲ (ACE2) تنظیم می‌شود [۸].

محور Ang-(1-7)/ACE2/Mas امروزه به عنوان یک مکانیسم اصلی در نظر گرفته می‌شود که اثرات منقضی کننده عروق RAS کالاسیک را که شامل رین، ACE، ANG II و گیرنده‌های آن AT1 و AT2 است، متعادل می‌کند [۲۱]. بنابراین به نظر می‌رسد در بیماران Post HF با افزایش ACE-2 سطح Ang II کاهش یافته و افزایش سطح Ang نتیجه افزایش ACE باشد [۲۱]؛ البته در تحقیق ما با وجود افزایش ACE2، تعییرات ACE2 نسبت به گروه کترول معنی دار نبود ماگلهاس و همکاران (۲۰۰۰) در تحقیق‌شان عنوان کردند که تمرینات ورزشی با افزایش سطح ACE-2 موجب کاهش تولید Ang II و افزایش سطح Ang و در نتیجه کاهش فشار خون می‌شود [۲۲]؛ در حالی که در تحقیق ما این تعییرات بدون تعییرات معنی دار ACE-2 مشاهده شد. می‌توان این احتمال را داد که این تعییرات مثبت در RAS در کاهش تولید Ang II و افزایش سطح Ang به علت تعییر در افزایش کارابی ACE-2 در سازگاری به تمرینات باشد تا تحت تاثیر کمیت این آنزیم، همچنین ممکن است که علت تعییرات مثبت در این آنزیم‌ها به علت کاهش ACE-1 یا عوامل دیگر مرتبط باشد که در تحقیق حاضر اندازه گیری نشند و از محدودیت‌های تحقیق ما بودند. دستگاه رین-آنژیوتانسین را می‌توان به عنوان یک دستگاه عملکردی دوگانه تلقی کرد که با تعادل نسبت ACE2/ACE می‌تواند به صورت گشاد کننده رگی / مهارتکننده سلولی، یا تنگ کننده رگی / تکشیر سلولی تعییر حالت دهد [۲۳]. براین اساس افزایش نسبت ACE2/ACE منجر به کاهش تولید Ang II و افزایش سطح Ang و رگ گشایی می‌شود در حالی که کاهش نسبت ACE2/ACE باعث افزایش Ang II و کاهش سطح FMD و رگ تنگی می‌شود [۲۳]. در تحقیق ما نیز نتایج حاکی از بهبود پس از دوره مداخله تمرین بود که این رگ گشایی عملکردی نسبت به جریان خون می‌تواند در ارتباط با کاهش مقاومت محیطی عروق در سازگاری به تمرینات ورزشی ایجاد شده باشد [۲۴]. می‌توان بهبود FMD در تحقیق حاضر را به عنوان یک سازگاری عروقی به جلسات تمرین

دیده شد همچنین ممکن است این سازگاری‌ها به صورت غیرمستقیم به تغییرات اپلین ۱۷ مرتبط باشند؛ که با توجه به دانش کونی در خصوص اثرات تمرينات ورزشی بر این سایتوکین، نیاز به تحقیقات بیشتر در این خصوص می‌باشد.

نتیجه گیری

در کل یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که هشت هفته تمرينات تناوبی هوایی با افزایش سطح اپلین-۱۷ و تنظیم آنزیم‌های موثر بر عروق خونی موجب کاهش فشار محیطی عروق خون و در نتیجه تسهیل جریان خون در بیماران مبتلا به HF شد که می‌تواند برای بیماران مبتلا به HF مفید باشد.

ملاحظات اخلاقی

پیروی از اصول اخلاق پژوهش

تمامی مراحل تحقیق حاضر توسط کمیته اخلاق پژوهشگاه تربیت بدنی تایید شده است (IR.SSRI.REC.1400.1231).

حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد

مشارکت نویسنده‌گان

مفهوم سازی، روش شناسی، تحلیل داده‌ها، تهییه پیش نویس اولیه، ویرایش و بررسی، مدیریت پروژه: حمید طالبی فرد، حبیب اصغرپور؛ گردآوری داده‌ها، بررسی، مفهوم سازی: حمید طالبی فرد، حبیب اصغرپور، عبدالامیر سیاری.

تعارض منافع

بنا بر اظهار نویسنده‌گان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

مقاله حاضر بخشی از رساله دکتری نویسنده اول ثبت شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول است. نویسنده‌گان از تمامی کسانی که در انجام این تحقیق همکاری کرده‌اند، سپاسگزاری می‌کنند.

References

- [1] Oh GC, Cho HJ. Blood pressure and heart failure. *Clinical hypertension.* 2020 Dec;26:1-8 [Link].
- [2] Jing MY, Li XY, Hao XY, Song GM. The impact of inspiratory muscle training on exercise capacity and inspiratory muscle strength in heart failure patients: a meta-analysis. *TMR Non-drug Therapy.* 2019 Dec 6;2(4):117-26 [Link].
- [3] Khoury EE, Kinane S, Aronson D, Amir O, Ghanim D, Volinsky N, Azzam Z, Abassi Z. Natriuretic peptides system in the pulmonary tissue of rats with heart failure: potential involvement in lung edema and inflammation. *Oncotarget.* 2018 Apr 4;9(31):21715. [10.18632/oncotarget.24922] [PMID]
- [4] Kannel WB, D'Agostino RB, Silbershatz H, Belanger AJ, Wilson PW, Levy D. Profile for estimating risk of heart failure. *Archives of internal medicine.* 1999 Jun 14;159(11):1197-204. [10.1001/archinte.159.11.1197] [PMID]
- [5] Dyck GJ, Raj P, Zieroth S, Dyck JR, Ezekowitz JA. The effects of resveratrol in patients with cardiovascular disease and heart failure: a narrative review. *International journal of molecular sciences.* 2019 Feb 19;20(4):904. [10.3390/ijms20040904] [PMID]
- [6] Mansouri A, Baraz S, Elahi N, Miladinia M, Malehi AS. The Status of Quality of Life and Adaptation of Patients with Heart Failure to Their Disease in Shushtar, Khuzestan Province. *Jundishapur Journal Of Chronic Disease Care.* 2017 Jan 31;6(1). [10.17795/jcdc-38460]
- [7] Sung MM, Dyck JR. Therapeutic potential of resveratrol in heart failure. *Annals of the New York Academy of Sciences.* 2015 Aug;1348(1):32-45. [10.1111/nyas.12839] [PMID]
- [8] Aimo A, Vergaro G, Passino C, Clerico A. Evaluation of pathophysiological relationships between renin-angiotensin and ACE-ACE2 systems in cardiovascular disorders: From theory to routine clinical practice in patients with heart failure. *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences.* 2021 Nov 17;58(8):530-45. [10.1080/10408363.2021.1942782] [PMID]
- [9] Fischer C. A patent review of apelin receptor (APJR) modulators (2014-2019). *Expert Opinion on Therapeutic Patents.* 2020 Apr 2;30(4):251-61. [10.1080/13543776.2020.1731473] [PMID]
- [10] Tatimoto K, Hosoya M, Habata Y, Fujii R, Kakegawa T, Zou MX, Kawamura Y, Fukumumi S, Hinuma S, Kitada C, Kurokawa T. Isolation and characterization of a novel endogenous peptide ligand for the human APJ receptor. *Biochemical and biophysical research communications.* 1998 Oct 20;251(2):471-6. [10.1006/bbrc.1998.9489] [PMID]
- [11] Chandrasekaran B, Dar O, McDonagh T. The role of apelin in cardiovascular function and heart failure. *European journal of heart failure.* 2008 Aug;10(8):725-32. [10.1006/bbrc.1998.9489] [PMID]
- [12] Jiang W, Hu W, Ye L, Tian Y, Zhao R, Du J, Shen B, Wang K. Contribution of Apelin-17 to collateral circulation following cerebral ischemic stroke. *Translational Stroke Research.* 2019 Jun 15;10:298-307.. [10.1007/s12975-018-0638-7] [PMID].
- [13] Cano Martinez LJ, Coral Vazquez RM, Méndez JP, Trejo S, Perez Razo JC, Canto P. Serum concentrations of apelin-17 isoform vary in accordance to blood pressure categories in individuals with obesity class 3. *Clinical and Experimental Hypertension.* 2019;41(2):168-73. [10.1080/10641963.2018.1462374] [PMID]
- [14] Piepoli MF, Binno S, Coats AJ, Cohen-Solal A, Corrà U, Davos CH, Jaarsma T, Lund L, Niedenseer D, Orso F, Villani GQ. Regional differences in exercise training implementation in heart failure: findings from the Exercise Training in Heart Failure (ExTraHF) survey. *European journal of heart failure.* 2019 Sep;21(9):1142-8. [10.1002/ejhf.1538] [PMID]
- [15] Tucker WJ, Beaudry RI, Liang Y, Clark AM, Tomczak CR, Nelson MD, Ellingsen O, Haykowsky MJ. Meta-analysis of exercise training on left ventricular ejection fraction in heart failure with reduced ejection fraction: a 10-year update. *Progress in cardiovascular diseases.* 2019 Mar 1;62(2):163-71. [10.1016/j.pcad.2018.08.006] [PMID]
- [16] Russell SD, Saval MA, Robbins JL, Ellestad MH, Gottlieb SS, Handberg EM, Zhou Y, Chandler B, HF-ACTION Investigators. New York Heart Association functional class predicts exercise parameters in the current era. *American heart journal.* 2009 Oct 1;158(4):S24-30. [10.1016/j.ahj.2009.07.017] [PMID]
- [17] Han C, Xian Z, Zou Y, Liao Z, Yang R, Zou C, Wang X, Sun Y. Flow-mediated dilation can be used to predict incident hypertension in patients with hyperuricemia. *Archives of Medical Science.* 2019 Mar 1;15(2):343-9. [10.5114/aoms.2018.73856] [PMID]
- [18] Mahmoodinezhad S, Shakerian S, Ghalavand A, Motamed P, Delaramnasab M. The Effect of acute training and circadian rhythm on blood hemostasis in female athletes. *International Journal of Basic Science in Medicine.* 2016 Jun 22;1(1):8-12. [10.15171/ijbsm.2016.03]
- [19] Ghalavand A, Shakerian S, Monazamnezhad A, Delaramnasab M. The effect of resistance training on cardio-metabolic factors in males with type 2 diabetes. *Jundishapur Journal of Chronic Disease Care.* 2014 Oct 1;3(4). [10.17795/jjcdc-23346]
- [20] Zucker IH, Schultz HD, Patel KP, Wang H. Modulation of angiotensin II signaling following exercise training in heart failure. *American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.* 2015 Apr 15;308(8):H781-91. [10.1152/ajpheart.00026.2015] [PMID]
- [21] Aleinina N, dos Santos RA. Angiotensin-(1-7) and Mas: a brief history. The Protective Arm of the Renin Angiotensin System (RAS). 2015:155. [10.1016/B978-0-12-801364-9.00021-3]
- [22] Magalhães DM, Nunes-Silva A, Rocha GC, Vaz LN, de Faria MH, Vieira EL, Rocha NP, e Silva AC. Two protocols of aerobic exercise modulate the counter-regulatory axis of the renin-angiotensin system. *Heliyon.* 2020 Jan 1;6(1). [10.1016/j.heliyon.2020.e03208] [PMID]
- [23] Alexandre-Santos B, Giori IG, de Oliveira Medeiros GR, Vieira CP, Conte-Junior CA, da Nobrega AC, Frantz ED. Renin-angiotensin system modulation through enalapril and/or exercise training improves visceral adiposity in obese mice. *Life Sciences.* 2022 Feb 15;291:120269. [10.1016/j.lfs.2021.120269] [PMID]
- [24] Jokar M, Ghalavand A. Improving endothelial function following regular pyramid aerobic training in patients with type 2 diabetes. *Razi Journal of Medical Sciences.* 2021 Sep 10;28(6):60-9. [Link]
- [25] Green DJ, Maiorana A, O'Driscoll G, Taylor R. Effect of exercise training on endothelium-derived nitric oxide function in humans. *The Journal of physiology.* 2004 Nov;561(1):1-25. [10.1113/jphysiol.2004.068197] [PMID]
- [26] Fernandez KX, Fischer C, Vu J, Gheblawi M, Wang W, Gottschalk S, Iturrio X, Llorens-Cortés C, Oudit GY, Vederas JC. Metabolically stable apelin-analogues, incorporating cyclohexylalanine and homoarginine, as potent apelin receptor activators. *RSC Medicinal Chemistry.* 2021;12(8):1402-13. [10.1039/d1md00120e] [PMID]
- [27] Fujie S, Sato K, Miyamoto-Mikami E, Hasegawa N, Fujita S, Sanada K, Hamaoka T, Iemitsu M. Reduction of arterial stiffness by exercise training is associated with increasing plasma apelin level in middle-aged and older adults. *PloS one.* 2014 Apr 1;9(4):e93545. [10.1371/journal.pone.0093545] [PMID]
- [28] Son JS, Chae SA, Park BJ, Du M, Song W. Plasma apelin levels in overweight/obese adults following a single bout of exhaustive exercise: A preliminary cross-sectional study. *Endocrinología, diabetes y nutrición.* 2019 May 1;66(5):278-90 [10.1016/j.endinu.2018.12.005] [PMID]
- [29] de Oliveira AA, Vergara A, Wang X, Vederas JC, Oudit GY. Apelin pathway in cardiovascular, kidney, and metabolic diseases: Therapeutic role of apelin analogs and apelin receptor agonists. *Peptides.* 2022 Jan 1;147:170697. [10.1016/j.peptides.2021.170697] [PMID]